

Instrucciones: Resolver los siguientes problemas, los cuales deben contener planteamiento, desarrollo y solución de los mismos.

Sección 4.1 Fuerza e interacciones (página 149)

4.4 Un hombre arrastra un baúl por la rampa de un camión de mudanzas. La rampa está inclinada 20.0° y el hombre tira con una fuerza $\vec{F}$ cuya dirección forma un ángulo de 30.0° con la rampa (Fig. 1).

- ¿Qué $\vec{F}$ se necesita para que la componente F_x , paralela a la rampa, sea de 60.0 N ?
- ¿Qué magnitud tendrá entonces la componente F_y , perpendicular a la rampa?




Figura 1: Ejercicio 4.4

Sección 4.3 Segunda ley de Newton (página 149)

4.14 Un electrón (masa $= 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$) sale de un extremo de un cinescopio con rapidez inicial v_i y viaja en línea recta hacia la rejilla aceleradora, a 1.80 cm de distancia, llegando a ella con rapidez de $3.00 \times 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Si la fuerza aceleradora es constante, calcule:

- la aceleración;
- el tiempo para llegar a la rejilla;
- la fuerza neta en Newtons

Nota: Considere despreciable la fuerza gravitacional sobre el electrón.

Sección 6.1 Trabajo (página 233)

6.4 Un obrero empuja horizontalmente una caja de 30.0 kg una distancia de 4.5 m en un piso plano, con una velocidad constante. El coeficiente de fricción cinética entre el piso y la caja es de 0.25 .

- a) ¿Qué magnitud de fuerza debe aplicar el obrero?
- b) ¿Cuánto trabajo efectúa sobre la caja?
- c) ¿Cuánto trabajo efectúa la fricción sobre la caja?
- d) ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza normal? ¿la gravedad?
- e) ¿Qué trabajo total se efectúa sobre la caja?

Sección 6.1 Trabajo (página 234)

- 6.23 Una bola de béisbol de 0.145 kg se lanza hacia arriba con rapidez inicial de $25.0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.
- a) ¿Cuánto trabajo ha realizado la gravedad sobre ella cuando alcanza una altura de 20.0 m sobre la mano del lanzador?
 - b) Use el teorema de trabajo - energía para calcular la rapidez de la bola a esa altura. Haga caso omiso de la resistencia del aire.
 - c) ¿La respuesta a la parte (b) depende de si la bola se está moviendo hacia arriba o hacia abajo cuando está a la altura de 20.0 m? Explique.

Sección 8.2 Conservación de la cantidad de movimiento (página 318) ¹

- 8.24 Dos patinadores, Daniel (65.0 kg) y Rebeca (45.0 kg) están practicando. Daniel se detiene para atar su agujeta y es golpeado por Rebeca, que se movía a $13.0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ antes de chocar con él. Después del choque, Rebeca se mueve a $8.00 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ con un ángulo de 53.1° respecto a su dirección original. La superficie de patinaje es horizontal y no tiene fricción.
- a) Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de Daniel después del choque.
 - b) ¿Cuál es el cambio en la energía cinética total de los dos patinadores como resultado del choque?

Referencias

- Sears, F., Zemansky, M., Young, H., y Freedman, R. (2004). *Física universitaria* (Décimo primera ed., Vol. 1). Pearson Educación.
- Sears, F., Zemansky, M., Young, H., y Freedman, R. (2009). *Física universitaria* (Decimo-segunda ed., Vol. 1). Pearson Educación.

¹En la decimosegunda edición del libro, este problema está en la sección 8.2 Conservación del momento lineal, numerado con el numeral 8.25 (página 277).