

Estadística para Negocios

Semana 5

- a) Tipos de distribución e intervalos.**
- b) Distribución discreta.**
- c) Distribución normal.**

¿Cómo diferenciar las distribuciones de probabilidad discreta y continua?

En las distribuciones discretas las variables tienen valores enteros, es decir $x = 0, 1, 2, \dots$; en cambio en las distribuciones continuas se pueden trabajar variables con números decimales. De las primeras tenemos: distribución binomial, hipergeométrica y Poisson; de las distribuciones continuas tenemos la distribución normal

¿Cómo ubicar un valor en la Tabla de distribución normal?

Primero se realiza el cálculo del valor z de acuerdo a la fórmula:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

En donde x es la observación. Los valores de z están entre 0 y 3. Por ejemplo, tenemos 2.57

Después, buscar la parte entera y las décimas en la primera columna (en este caso 2.5).

Buscar las centésimas en la primera fila (en este caso 7).

En donde se cruza la fila y la columna tenemos la probabilidad buscada,

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9913
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974

En este caso 0.9949.

Por tanto $p(Z \leq 2.57) = 0.9949$.

Si se desea calcular $p(Z \geq 2.57) = 1 - 0.9949 = 0.0051$

¿Cómo diferenciar las distribuciones discretas?

En las distribuciones discretas tenemos: distribución binomial, hipergeométrica y Poisson; en la primera los resultados están expresados en éxitos o fracasos y solo se tienen dos posibles resultados, en la distribución de Poisson los resultados se expresan en unidad de área, tiempo, pieza, etc, y en las distribuciones hipergeométricas las probabilidades no son constantes en cada experimento.

¿Cuáles son las características de la distribución normal?

Es una campana simétrica es por esto por lo que la media, mediana y la moda se encuentran todas en el centro. El área bajo la curva representa las probabilidades de ocurrencia de un evento.