


MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

TEMAS SEMANA 5:

- a) Simulación financiera y programación
 - b) Introducción a los procesos de simulación financiera
 - c) Distribuciones de probabilidad
 - d) Módulos de programación
 - e) Condicionales “si... entonces...”
 - f) Aplicación de funciones internas de Excel en la programación
 - g) Programación de aplicaciones financieras
- ¿Qué es una distribución normal, para qué sirve una regresión lineal y cómo se calcula?


La regresión lineal es un método estadístico que permite ajustar una línea recta a una serie de valores de una variable aleatoria, con una cierta precisión de error, para realizar predicciones de la misma, con la intención de simular un valor futuro de una manera científica, que permita tomar decisiones cuando ésta se aplica a los temas financieros; todo ello apoyado en el uso de una distribución de probabilidad, conocida como función de probabilidad Normal o campana de Gauss



Ejemplos de ajuste de líneas rectas a los datos

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

La distribución normal, es una distribución de probabilidad continua y no discreta. Varios matemáticos han contribuido a su desarrollo, entre los que podemos contar al astrónomo-matemático del siglo XVIII, Karl Gauss. En honor a su trabajo, la distribución de probabilidad normal también es conocida como distribución gaussiana.



Existen dos razones fundamentales por las cuales la distribución normal ocupa un lugar tan prominente en la estadística. Primero, tiene algunas propiedades que la hacen aplicable a un gran número de situaciones en las que es necesario hacer inferencias o predicciones o simulaciones frecuencias reales observadas en muchos fenómenos, incluyendo características humanas (peso, altura, coeficiente intelectual), resultados de procesos físicos (dimensiones y rendimientos), y muchas otras medidas de interés para los administradores, tanto en el sector público como en el privado.


Es peligroso escoger entre los datos solo porque se ajusten o no a una idea preconcebida de cual debe ser la conclusión. En el análisis de regresión, la selección cuidadosa y el uso consiente de la mejor base de datos lleva a la ecuación de estimación más valiosa.

Veamos un ejemplo de como se hace el calculo de una regresión lineal, para ajustar una línea recta a una serie de datos.

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

“Las librerías de la universidad han venido el libro *Believe or Not: Wonders of Statistics Guide* durante 12 semestres y desean estimar la relación entre las ventas y el numero de secciones de estadística elemental que se enseñan en cada semestre”.

Se recolectaron los siguientes datos:



Datos y gráfico de dispersión de los mismos, con recta lineal ajustada

El cálculo de la regresión lineal se hace de la siguiente manera:

En este problema, Y = ventas y X = número de secciones.

X	Y	XY	X ²	Y ²
3	33	99	9	1,089
7	38	266	49	1,444
6	24	144	36	576
6	61	366	36	3,721
10	52	520	100	2,704
12	45	540	144	2,025
12	65	780	144	4,225
13	82	1,066	169	6,724
12	29	348	144	841
13	63	819	169	3,969
14	50	700	196	2,500
15	79	1,185	225	6,241
$\Sigma X = 123$	$\Sigma Y = 621$	$\Sigma XY = 6,833$	$\Sigma X^2 = 1,421$	$\Sigma Y^2 = 36,059$

$$\bar{X} = 123/12 = 10.25 \quad \bar{Y} = 621/12 = 51.75$$

$$b = \frac{\Sigma XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\Sigma X^2 - n\bar{X}^2} = \frac{6,833 - 12(10.25)(51.75)}{1,421 - 12(10.25)^2} = 2.9189$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X} = 51.75 - 2.9189(10.25) = 21.8313$$

Entonces, $Y = 21.8313 + 2.9189X$ es la recta de regresión lineal ajustada a los datos

$$r^2 = \frac{a\Sigma Y + b\Sigma XY - n\bar{Y}^2}{\Sigma Y^2 - n\bar{Y}^2} \quad \text{es el coeficiente de determinación de la muestra}$$

$$= \frac{21.8313(621) + 2.9189(6,833) - 12(51.75)^2}{36,059 - 12(51.75)^2} = 0.3481$$

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS


El coeficiente de determinación de la muestra nos dice el porcentaje ajustada.

Los anteriores cálculos en Excel, quedarían realizados de la siguiente manera, por ejemplo:

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3	n	X Número de secciones	Y Ventas (unidades)	XY	X ²	Y ²	Y estimada (regresión lineal)
4	1	3	33	99	9	1089	30.58814353
5	2	7	38	266	49	1444	42.26365055
6	3	6	24	144	36	576	39.34477379
7	4	6	61	366	36	3721	39.34477379
8	5	10	52	520	100	2704	51.02028081
9	6	12	45	540	144	2025	56.85803432
10	7	12	65	780	144	4225	56.85803432
11	8	13	82	1066	169	6724	59.77691108
12	9	12	29	348	144	841	56.85803432
13	10	13	63	819	169	3969	59.77691108
14	11	14	50	700	196	2500	62.69578783
15	12	15	79	1185	225	6241	65.61466459
16	Σ	123	621	6833	1421	36059	
17							
18		16	Predicción para valor de X de 16 secciones =				68.53354134
19							
20			X promedio =	10.25			
21			Y promedio =	51.75			
22			b =	2.9188768			
23			a =	21.831513			
24			Y estimada (regresión lineal) = 21.8315132605304 + 2.9188767550702 X				
25			r ² =	0.3480922			

Donde adicionalmente podemos ya calcular predicciones futuras, por ejemplo, cuál sería la predicción para el valor de X = 16 secciones.

Éste sería el gráfico resultante:



MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS


Y éstas serían las fórmulas que quedaron capturadas en las celdas de la hoja de Excel, para los cálculos mostrados anteriormente:

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		X	Y				
3	n	Número de secciones	Ventas (unidades)	XY	X ²	Y ²	Y estimada (regresión lineal)
4	1	3	33	=B4*C4	=B4^2	=C4^2	=SD\$23+SD\$22*B4
5	2	7	38	=B5*C5	=B5^2	=C5^2	=SD\$23+SD\$22*B5
6	3	6	24	=B6*C6	=B6^2	=C6^2	=SD\$23+SD\$22*B6
7	4	6	61	=B7*C7	=B7^2	=C7^2	=SD\$23+SD\$22*B7
8	5	10	52	=B8*C8	=B8^2	=C8^2	=SD\$23+SD\$22*B8
9	6	12	45	=B9*C9	=B9^2	=C9^2	=SD\$23+SD\$22*B9
10	7	12	65	=B10*C10	=B10^2	=C10^2	=SD\$23+SD\$22*B10
11	8	13	82	=B11*C11	=B11^2	=C11^2	=SD\$23+SD\$22*B11
12	9	12	29	=B12*C12	=B12^2	=C12^2	=SD\$23+SD\$22*B12
13	10	13	63	=B13*C13	=B13^2	=C13^2	=SD\$23+SD\$22*B13
14	11	14	50	=B14*C14	=B14^2	=C14^2	=SD\$23+SD\$22*B14
15	12	15	79	=B15*C15	=B15^2	=C15^2	=SD\$23+SD\$22*B15
16	Σ	=SUMA(B4:B15)	=SUMA(C4:C15)	=SUMA(D4:D15)	=SUMA(E4:E15)	=SUMA(F4:F15)	
17	16					Predicción para valor de X de 16 secciones =	=SD\$23+SD\$22*B18
18							
19							
20				X promedio =	=B16/A15		
21				Y promedio =	=C16/A15		
22				b =	=(D16-A15*D20*D21)/(E16-A15*(D20^2))		
23				a =	=D21-D22*D20		
24				Y estimada (regresión lineal) =	=CONCATENAR(D23," + ",D22," X")		
25				r ² =	=(D23*C16+D22*D16-A15*(D21^2))/(F16-A15*(D21^2))		

- ¿Qué usos tiene el condicional “si ... entonces ...”?

En el mundo de la computación, es una expresión que permite cambiar el curso de la lógica de un programa, eligiendo entre dos disyuntivas, “la verdadera” o “la falsa” conforma a “una condición lógica”


Una manera sencilla de comprender a que nos referimos con una disyuntiva la encontramos en el diagrama de flujo siguiente:



MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

Por ejemplo, podemos crear la condición “¿Esta en verde el semáforo?”. Y si al observar el semáforo nos encontramos luz amarilla o roja, habremos de “frenar”, porque la condición lógica es “falsa”; en caso contrario habremos de “continuar” nuestro camino, porque la condición lógica es “verdadera”.

Lo cual queda ilustrado de la siguiente forma:



Esto mismo sucede con la programación de los formularios de Excel. En Excel existe la función “SI”, cuya sintaxis es la siguiente:

SI(prueba_lógica, [valor_si_verdadero], [valor_si_falso])

Aquí podemos observar, que al igual que en el primer ejemplo, la función requiere 3 parámetros, el primero que se refiere a la “condición lógica”, y el segundo y tercero, a las acciones que tienen que realizarse, cuando dicha condición es “verdadera” o “falsa”.

El mismo ejemplo ahora ilustrado utilizando la función “SI”, quedaría de la siguiente forma:

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

SI(SEMAFORO="LUZ VERDE",MOVIMIENTO="CONTINUAR",MOVIMIENTO="DETENER")

Ahora vamos a hacer un ejemplo en la hoja de Excel, para que la función "SI", nos devuelva si la calificación de un alumno es de "reprobado" o de "aprobado" en el curso. Para ello, requerimos tener la tabla de calificaciones:

	A	B	C	D
1	ALUMNO	CALIFICACION	ESTATUS	FUNCION USADA
2	RAUL	10		
3	SANDRA	4		
4	LAURA	7		
5	LUIS	3		
6	ALEJANDRO	6		

Y ahora, entonces la función "SI", que utilizaremos en la celda C2 de ésta hoja de Excel, para que podamos definir el estatus del alumno es la siguiente:

SI(B2<6,"REPROBADO","APROBADO")

¿Qué significa esto?, pues que la condición lógica a verificar es si el contenido de la celda B2, es una calificación menor que 6 o no. En caso, de que la calificación contenida en la celda sea menor que 6, entonces que la condición lógica es "verdadera", y entonces lo que Excel tiene que hacer, es reportar en la celda C2, que es donde se encuentra capturada la función "SI", la palabra "REPROBADO", pues es lo que hemos indicado que haga cuando el "valor si es verdadero", correspondiente al segundo parámetro de dicha función. En cambio, cuando la condición lógica es "falsa", es decir cuando el contenido de la celda C2, es una calificación mayor o igual que 6, el mensaje que nos reportara Excel, es "APROBADO", ya que así fue como programamos dicha función "SI".

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

Veamos entonces como quedan reflejados los valores de las celdas de la columna “C”, y en la columna “D” la función capturada en las celdas de la columna “C”, para que puedan observar ambas cosas, el resultado de la función y la función utilizada.

Recuerda que las formulas y funciones que captures en las celdas de Excel, las debes de comenzar con el signo “=” o el signo “+”

	A	B	C	D
1	ALUMNO	CALIFICACION	ESTATUS	FUNCION USADA
2	RAUL	10	APROBADO	=SI(B2<6,"REPROBADO","APROBADO")
3	SANDRA	4	REPROBADO	=SI(B3<6,"REPROBADO","APROBADO")
4	LAURA	7	APROBADO	=SI(B4<6,"REPROBADO","APROBADO")
5	LUIS	3	REPROBADO	=SI(B5<6,"REPROBADO","APROBADO")
6	ALEJANDRO	6	APROBADO	=SI(B6<6,"REPROBADO","APROBADO")

- ¿Cómo se utiliza la función “CONTAR.SI”?

La función “CONTAR.SI”, se utiliza para contar los elementos de un “rango” de valores, que cumplan con un “criterio”, el cual es una “condición lógica”. Esta es su sintaxis:

CONTAR.SI(rango, criterio)

Por ejemplo, si deseamos contar el número de veces que aparece la palabra “APROBADO”, o el número total de números menores que 7. En la siguiente tabla encontramos la manera de realizarlo:

	A	B	C	D
1	ALUMNO	CALIFICACION	ESTATUS	FUNCION USADA
2	RAUL	10	APROBADO	=SI(B2<6,"REPROBADO","APROBADO")
3	SANDRA	4	REPROBADO	=SI(B3<6,"REPROBADO","APROBADO")
4	LAURA	7	APROBADO	=SI(B4<6,"REPROBADO","APROBADO")
5	LUIS	3	REPROBADO	=SI(B5<6,"REPROBADO","APROBADO")
6	ALEJANDRO	6	APROBADO	=SI(B6<6,"REPROBADO","APROBADO")
7				
8		=CONTAR.SI(C2:C6,"APROBADO")		2:C6,"APROBADO")
9			3	=CONTAR.SI(B2:B6,"<7")

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

En la imagen, podemos ver como utilizando la función “CONTAR.SI”, capturada en la celda B8, queremos obtener, el numero de veces que aparece la palabra “APROBADO”, en el rango C2:C6 (es decir el grupo de celdas, C2, C3, C4, C5 y C6), sujeto al “criterio” o “condición lógica” de “APROBADO”. Aquí la condición lógica nos dice “aquellas celdas cuyo contenido sea la palabra “APROBADO”.

	A	B	C	D
1	ALUMNO	CALIFICACION	ESTATUS	FUNCION USADA
2	RAUL	10	APROBADO	=SI(B2<6,"REPROBADO","APROBADO")
3	SANDRA	4	REPROBADO	=SI(B3<6,"REPROBADO","APROBADO")
4	LAURA	7	APROBADO	=SI(B4<6,"REPROBADO","APROBADO")
5	LUIS	3	REPROBADO	=SI(B5<6,"REPROBADO","APROBADO")
6	ALEJANDRO	6	APROBADO	=SI(B6<6,"REPROBADO","APROBADO")
7				
8			3	=CONTAR.SI(C2:C6,"APROBADO")
9		=CONTAR.SI(B2:B6,"<7")		2:B6,"<7")

Y en esta otra imagen, podemos ver como a través de la función “CONTAR.SI”, se desea contar el número total de números que son menores a 7, en el “rango” B2:B6 (es decir el grupo de celdas, B2,B3,B4,B5 y B6), sujeto al “criterio” o “condición lógica” de “<7”. Aquí la condición lógica nos dice aquellas celdas cuyo contenido sea un numero menor que 7”

Finalmente, entonces el resultado es el siguiente:

	A	B	C	D
1	ALUMNO	CALIFICACION	ESTATUS	FUNCION USADA
2	RAUL	10	APROBADO	=SI(B2<6,"REPROBADO","APROBADO")
3	SANDRA	4	REPROBADO	=SI(B3<6,"REPROBADO","APROBADO")
4	LAURA	7	APROBADO	=SI(B4<6,"REPROBADO","APROBADO")
5	LUIS	3	REPROBADO	=SI(B5<6,"REPROBADO","APROBADO")
6	ALEJANDRO	6	APROBADO	=SI(B6<6,"REPROBADO","APROBADO")
7				
8			3	=CONTAR.SI(C2:C6,"APROBADO")
9			3	=CONTAR.SI(B2:B6,"<7")

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

Es decir, en ambas situaciones los elementos contados son 3 en total, tres veces que aparece la palabra “APROBADO” en la columna “C” y tres veces que encontramos números menores que 7 en la columna “B”.

- ¿Como se utiliza la función “BUSCARV”?

La función “BUSCARV” se utiliza para relacionar los valores de una columna en una tabla, con los valores de otra columna en otra tabla o “matriz_tabla”, tomando como punto de unión, entre una y otra tabla, el elemento buscado o “valor_buscado”. Esta es su sintaxis:

BUSCARV(valor_buscado, matriz_tabla, indicador_columnas, [rango])

Por ejemplo, si deseamos colocar la calificación de los alumnos en “letra”, en una tabla con sus calificaciones

	A	B	C	D
1	ALUMNO	CALIFICACION	CON LETRA	FUNCION USADA
2	RAUL	10		
3	SANDRA	4		
4	LAURA	7		
5	LUIS	3		
6	ALEJANDRO	6		
7				
8		matriz_tabla		
9		1	UNO	
10		2	DOS	
11		3	TRES	
12		4	CUATRO	
13		5	CINCO	
14		6	SEIS	
15		7	SIETE	
16		8	OCHO	
17		9	NUEVE	
18		10	DIEZ	

Partiendo de los datos de la tabla anterior de calificaciones. La manera de realizarlo es la siguiente.

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

Nos ubicamos en la celda C2, y procedemos a capturar la función “BUSCARV” para ingresar el primer parámetro de la misma, que es el punto de unión o elemento buscado o “valor_buscado”, para señalar a Excel, que ese es el valor al que nos interesa asociarle el otro valor de la “matriz_tabla”, en la tabla de calificaciones que nos ocupa.

	A	B	C	D
1	ALUMNO	CALIFICACION	CON LETRA	FUNCION USADA
2	RAUL	=BUSCARV(B2		
3	SANDRA	BUSCARV(valor_buscado, matriz_tabla, indicador_columnas, [rango])		
4	LAURA	7		
5	LUIS	3		
6	ALEJANDRO	6		
7				
8		matriz_tabla		
9		1	UNO	
10		2	DOS	
11		3	TRES	
12		4	CUATRO	
13		5	CINCO	
14		6	SEIS	
15		7	SIETE	
16		8	OCHO	
17		9	NUEVE	
18		10	DIEZ	

Ingresamos “una coma” y elegimos el rango de celdas correspondientes a la “matriz_tabla” sin tomar en cuenta los encabezados de las columnas, este rango solo debe incluir valores. Una vez hecho esto, presionamos una vez en la tecla “F4”, para que en automático Excel fije dicha matriz como una referencia absoluta, o nosotros manualmente le indicamos con un signo de “\$” a Excel, que las celdas de ese rango son celdas de referencia absoluta. Una nota importante, la primera columna de la “matriz_tabla” debe ser la de la columna que contenga el “valor_buscado” y todos los demás elementos a su derecha.

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

	A	B	C	D
1	ALUMNO	CALIFICACION	CON LETRA	FUNCION USADA
2	RAUL	=BUSCARV(B2,\$B\$9:\$C\$18		
3	SANDRA	BUSCARV(valor_buscado, matriz_tabla, indicador_columnas, [rango])		
4	LAURA	7		
5	LUIS	3		
6	ALEJANDRO	6		
7				
8		matriz_tabla		
9		1	UNO	
10		2	DOS	
11		3	TRES	
12		4	CUATRO	
13		5	CINCO	
14		6	SEIS	
15		7	SIETE	
16		8	OCHO	
17		9	NUEVE	
18		10	DIEZ	

Ingresamos “una coma” nuevamente e indicamos a Excel, que el valor para el tercer parametro de “indicador_columnas” de la funcion “BUSCARV” es el numero de columna correspondiente en el orden de columnas de la tabla “matriz_tabla”, en donde se encuentra el valor que queremos asociarle a la tabla original. En nuestro ejemplo, pues es la columna numero 2, pero estos valores pudieron haberse encontrado en la columna 5 por ejemplo, si es que hubiera 3 columnas intermedias entre la del valor_buscado y el valor a asociar.

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

	A	B	C	D
1	ALUMNO	CALIFICACION	CON LETRA	FUNCION USADA
2	RAUL	=BUSCARV(B2,\$B\$9:\$C\$18,2		
3	SANDRA	BUSCARV(valor_buscado, matriz_tabla, indicador_columnas, [rango])		
4	LAURA	7		
5	LUIS	3		
6	ALEJANDRO	6		
7				
8		matriz_tabla		
9		1	UNO	
10		2	DOS	
11		3	TRES	
12		4	CUATRO	
13		5	CINCO	
14		6	SEIS	
15		7	SIETE	
16		8	OCHO	
17		9	NUEVE	
18		10	DIEZ	

Y finalmente, ingresamos “una coma”, y el cuarto parámetro de la función “BUSCARV”, colocamos un “numero cero”, para indicarle con ello a Excel, que deseamos que en la tabla “matriz_tabla”, nos busque los valores punto de unión, que sean exactamente iguales al “valor_buscado” y no aproximaciones al mismo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1	ALUMNO	CALIFICACION	CON LETRA	FUNCION USADA					
2	RAUL	=BUSCARV(B2,\$B\$9:\$C\$18,2,0							
3	SANDRA	BUSCARV(valor_buscado, matriz_tabla, indicador_columnas, [rango])							
4	LAURA	7		(...) VERDADERO - Coincidencia aproximada					
5	LUIS	3		(...) FALSO - Coincidencia exacta					
6	ALEJANDRO	6		CONSULTAV solamente buscará una coincidencia exacta					
7									
8		matriz_tabla							
9		1	UNO						
10		2	DOS						
11		3	TRES						
12		4	CUATRO						
13		5	CINCO						
14		6	SEIS						
15		7	SIETE						
16		8	OCHO						
17		9	NUEVE						
18		10	DIEZ						

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

Cerramos el paréntesis, y damos enter, y podremos observar como Excel, nos devuelve en la celda B2, el elemento buscado.

	A	B	C	D
1	ALUMNO	CALIFICACION	CON LETRA	FUNCION USADA
2	RAUL	10	DIEZ	
3	SANDRA	4		
4	LAURA	7		
5	LUIS	3		
6	ALEJANDRO	6		
7				
8		matriz_tabla		
9		1	UNO	
10		2	DOS	
11		3	TRES	
12		4	CUATRO	
13		5	CINCO	
14		6	SEIS	
15		7	SIETE	
16		8	OCHO	
17		9	NUEVE	
18		10	DIEZ	

Por último, entonces el resultado es el siguiente:

	A	B	C	D
1	ALUMNO	CALIFICACION	CON LETRA	FUNCION USADA
2	RAUL	10	DIEZ	=BUSCARV(B2,\$B\$9:\$C\$18,2,0)
3	SANDRA	4	CUATRO	=BUSCARV(B3,\$B\$9:\$C\$18,2,0)
4	LAURA	7	SIETE	=BUSCARV(B4,\$B\$9:\$C\$18,2,0)
5	LUIS	3	TRES	=BUSCARV(B5,\$B\$9:\$C\$18,2,0)
6	ALEJANDRO	6	SEIS	=BUSCARV(B6,\$B\$9:\$C\$18,2,0)
7				
8		matriz_tabla		
9		1	UNO	
10		2	DOS	
11		3	TRES	
12		4	CUATRO	
13		5	CINCO	
14		6	SEIS	
15		7	SIETE	
16		8	OCHO	
17		9	NUEVE	
18		10	DIEZ	

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

Es decir que, a la calificación de 10 en la tabla de calificaciones, le toca el texto “DIEZ” de la tabla “matriz_tabla”, y así sucesivamente a las demás calificaciones numéricas de la tabla de calificaciones de los alumnos. Hasta llegar a la calificación de 6, a la cual le toca el texto “SEIS”.

- ¿Cómo se evalúan las condiciones lógicas que se utilizan tanto en las funciones “SI”, “CONTAR.SI” y “BUSCARV”?

Hay que recordar que existe la logica booleana. Y que en ella se estudian las tablas de verdad:

	A	B	C	D	E	F
1	A	B	A y B	Condición	A o B	Condición
2				lógica usada		lógica usada
3	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	=Y(B3,C3)	VERDADERO	=O(B3,C3)
4	VERDADERO	FALSO	FALSO	=Y(B4,C4)	VERDADERO	=O(B4,C4)
5	FALSO	VERDADERO	FALSO	=Y(B5,C5)	VERDADERO	=O(B5,C5)
6	FALSO	FALSO	FALSO	=Y(B6,C6)	FALSO	=O(B6,C6)

Así, por ejemplo, si queremos indicarle a Excel la “condición lógica” en que la celda F3<6 y además que las celda G8=“azul”, entonces la expresión que debemos utilizar es Y (F3<6,G8=“azul”); en caso de que ambas condiciones sean ciertas o “verdaderas”. Pues entonces el resultado de la “condición lógica” será también “verdadero”, como lo podemos observar en las tablas de verdad anteriores, en donde cuando A es “verdadero” y B es “verdadero”, entonces la “condición lógica” “A y B” es “verdadero”. Si por alguna razón, por ejemplo, la condición de que el contenido de la celda F3 no sea menor que 6, sino mayor o igual que 6, entonces esa “condición lógica” es falsa. Y de acuerdo con las tablas de verdad cuando tenemos que A es “falso” y B “verdadero”, entonces la “condición lógica” “A y B” es “falsa”, porque ambas condiciones deben ser ciertas siempre para que se cumpla el ser verdadero.

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA FINANZAS

En contra posición también podríamos querer evaluar una expresión lógica en donde la celda $F3 < 6$ o además la celda $G8 = \text{"azul"}$, entonces la expresión que debemos utilizar es $O(F3 < 6, G8 = \text{"azul"})$; en caso de que ambas condiciones sean ciertas o “verdaderas”, pues entonces el resultado de la “condición lógica” será también “verdadero”, como lo podemos observar en las tablas de verdad anteriores, en donde cuando A es “verdadero” o B es “verdadero”, entonces la “condición lógica” “A o B” es “verdadero”. Si por alguna razón, por ejemplo, la condición de que el contenido de la celda F3 no sea menor que 6, sino mayor o igual que 6, entonces esa “condición lógica” es falsa. Y de acuerdo con las tablas de verdad cuando tenemos que A es “falso” o B es “verdadero”, entonces la “condición lógica” “A o B” es “verdadero”, porque al menos una de las dos es cierta para que se cumpla el ser verdadero.